



ESTUDIO CUANTITATIVO Y COMPARATIVO EN RELACIÓN AL ABORTO Y A OTROS ASPECTOS DE LA SALUD SEXUAL-REPRODUCTIVA EN MUJERES ADOLESCENTES EN LAS CLÍNICAS GINEALMERÍA Y GINEGRANADA 2004-2006.



FUNDAMENTACIÓN

Investigar en nuestra realidad, para conocerla y extraer elementos que nos sean útiles para la prevención de embarazos no deseados. Los jóvenes cada vez tienen relaciones coitales más tempranas (16 años para los chicos y 17 años para las chicas) en correspondencia con ello, cada vez tenemos más mujeres adolescentes que acuden a nuestras clínicas. Conocer esta realidad para poder intervenir en la prevención de embarazos no deseados, nos animó a hacer un estudio en 2004 y repetir este que presentamos ahora.

OBJETIVOS

Conocer el colectivo de mujeres adolescentes en lo que se refiere a sus pautas de conducta en salud sexual y reproductiva, a través de las que acuden a Ginealmería y Ginegranada a practicarse una IVE por la especificidad que les confiere la edad, para intervenir con el conocimiento que nos aporta la realidad en la prevención de embarazos no deseados.

Con este estudio, queremos aportar algunos datos sobre la salud sexual de las mujeres adolescentes como:

- número de adolescentes que acuden a realizarse un aborto comparándolas con el año 2004.
- métodos anticonceptivos que fallan, se utilizan mal o no se utilizan. Uso de la píldora postcoital etc.

MATERIAL Y MÉTODO

DISEÑO: Estudio cuantitativo y comparativo año (2004-2006). Estudio de adolescentes comparativo en lo que hace referencia al número de usuarias, al uso de métodos anticonceptivos, y cuantitativo en el uso de la postcoital y a la edad en que interrumpen la gestación.

ÁMBITO DE ESTUDIO: Año 2006

SUJETOS: Mujeres de 12 a 17 años que acuden a las clínicas Ginegranada y Ginealmería a practicarse una IVE.

RECOGIDA DE DATOS: Mil historias clínicas de Ginealmería y mil de Ginegranada seleccionadas aleatoriamente.

VARIABLES DE ESTUDIO: Número de adolescentes. Edad. Método anticonceptivo que falla, utilizan mal o no utilizan. Uso de la píldora postcoital.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

NÚMERO DE ADOLESCENTES. COMPARACIÓN AÑOS 2004-2006. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL ESPAÑOLAS-INMIGRANTES. DISTRIBUCIÓN POR EDADES

NÚMERO DE ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS. COMPARACIÓN AÑOS 2004-2006




El número de mujeres que interrumpen la gestación en Ginegranada es de 53 y en Ginealmería de 48. Con un aumento entre el año 2004-2006 de 9 y 11 mujeres respectivamente. Numéricamente es poco importante, cobra relevancia por la edad (12 a 17 años).

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL ESPAÑOLAS-INMIGRANTES.



En las edades de 12 a 17 años son mayoría las mujeres de origen español que interrumpen su embarazo en ambas clínicas.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ABORTOS POR EDADES.



Entre los 15 y los 17 años se concentra el mayor número de interrupciones de embarazo, siendo 50 mujeres en Ginegranada y 40 en Ginealmería.

CAUSAS DEL EMBARAZO. COMPARATIVO AÑO 2004-2006


DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS 53 MUJERES ADOLESCENTES QUE INTERRUMPieron SU GESTACIÓN EN GINEGRANADA Y DE LAS 48 QUE LO HICIERON EN GINEALMERÍA, SEGÚN LAS CAUSAS DEL EMBARAZO.



En Ginegranada aumenta en 6 mujeres las que no usan ningún método anticonceptivo, numéricamente el fallo del método (frecuentemente rotura del preservativo) es igual a los datos recogidos en el 2004 y muy semejante al mal uso del método anticonceptivo.

En Ginealmería, el cambio se concentra en el aumento del mal uso del anticonceptivo (7 mujeres).

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS UTILIZADOS



Entre las adolescentes que usan anticonceptivos el más utilizado es el preservativo siendo despreciable el uso del resto de métodos.

Píldora postcoital: Del total de mujeres adolescentes que interrumpieron su gestación en Ginegranada (53) y en Ginealmería(48),ninguna había utilizado la píldora postcoital.

CONCLUSIONES

De las 1.000 mujeres, que interrumpen su gestación en Ginegranada, 53 son adolescentes entre 12 y 17 años y en Ginealmería, son 48. En dos años ha aumentado en 9 casos en Ginegranada y 11 en Ginealmería. Concentrándose entre los 15 y 17 años, 50 casos en Ginegranada y 40 en Ginealmería.

Numéricamente, no es importante y cobra relevancia por la edad.

La causa principal del embarazo de 26 mujeres en Ginealmería es no haber usado ningún método anticonceptivo. En Ginegranada a 24 de ellas les falló el método anticonceptivo.

Es semejante a los datos recogidos en 2004.

El método anticonceptivo por excelencia es el preservativo.

Ninguna de las usuarias que interrumpieron su embarazo había usado la anticoncepción de emergencia.