

# Estudio descriptivo de mujeres, con más de una interrupción de embarazo, atendidas en clínica Ginegranada. Septiembre 2007 – Diciembre 2008



Autores: Francisca G. Gallego, Bernardo O. Acuña, Manuel Passas y María Ramos.

## Fundamentación

Solo el análisis de la realidad permite determinar la estrategia necesaria para prevenir los embarazos no deseados.

## Material y método

Se seleccionaron 675 mujeres (49% inmigrantes) que acudieron a la Clínica mediante muestreo sistemático (1 de 4, según orden de llegada) a las que se les pidió contestar a una encuesta, desechándose 12 de ellas por motivos ajenos al estudio.


## Objetivos

1. Comparar el perfil del grupo de mujeres con más de un aborto con el del grupo que aborta por primera vez.
2. Determinar si después de una interrupción de embarazo se solicita información sobre anticoncepción y si se introducen cambios en la práctica anticonceptiva.
3. Conocer la implicación masculina en la anticoncepción.


## Variables de estudio

Nº de I.V.E, Lugar de procedencia, edad, pareja estable, tipo de financiación, lugar de información sobre anticoncepción, método anticonceptivo I.V.E anterior y actual, implicación de la pareja en la anticoncepción.

### Mujeres según número de abortos



### Lugar de procedencia




### EDAD

Los promedios de edad en mujeres con uno o más abortos es de 27 y 28 años respectivamente


### Porcentaje de mujeres con o sin pareja




### Nivel de ingresos




### Tipo de financiación




### Lugar del consejo anticonceptivo después de aborto anterior



### Cambio en el método anticonceptivo en mujeres con más de un aborto



### Implicación de la pareja en el uso de anticonceptivos



## Conclusiones

Se establecen 2 grupos según haya un aborto (71%) o más de uno (29%). En cuanto al perfil de ambos grupos, decir:

- Son similares respecto a edad, 27 y 28 años respectivamente.
- Nivel de ingresos, independientemente del grupo, en el 90% de los casos es inferior a 540 euros al mes.
- Más del 75% de las mujeres del estudio, sin diferencias entre grupos, tienen pareja estable pero solo en el 38% participa en la anticoncepción (compra los preservativos, recuerda la toma de la píldora etc.).
- En cuanto al lugar de procedencia, se aprecia diferencias sensibles, en el grupo de **mas de un** aborto las mujeres inmigrantes suponen un 49% cifra que baja a un 31% en el grupo de un solo aborto.
- La financiación pública se extiende al 60% de los casos, sin diferencias sensibles entre los 2 grupos.
- El 60% de las mujeres con más de un aborto no solicitan información sobre anticoncepción.
- El 30% de los casos siguen sin usar método anticonceptivo alguno, los cambios se producen por el uso del preservativo (mal uso) que aumenta en un 14%.