

HABITOS ANTICONCEPTIVOS Y ABORTO PROVOCADO



Autores: Francisca G. Gallego, Bernardo O. Acuña, María Ramos.



RESUMEN

El estudio realizado por ACAI (2010), "Anticoncepción fallida y aborto provocado" evidencia que el preservativo es el anticonceptivo prevalente en el 42.39% y el 28.79% no utiliza anticoncepción.

En el estudio Haya (2007) "Hábitos anticonceptivos y aborto" el preservativo también es el anticonceptivo prevalente 39.5% y el 53.90% lo utiliza incorrectamente. El 36.29% no utiliza anticoncepción. Por nacionalidades las españolas utilizan anticoncepción en el 73% frente al 50% de las inmigrantes.



OBJETIVO Y MÉTODO

Estudiar anticoncepción utilizada por 4.000 mujeres en Ginealmería y Ginegranada.

La selección se hizo de las mujeres que interrumpieron su embarazo hasta la semana 14 por decisión propia, por orden de llegada, se les solicitó contestar una encuesta.

VARIABLES DE ESTUDIO

País de procedencia y anticonceptivo utilizado.



RESULTADOS

- El 36.03% de las mujeres utilizan preservativo, el 17.02% lo usa incorrectamente.
- El 46.59% no utilizan anticonceptivo: el 34.16% españolas y el 69.62% inmigrantes.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El anticonceptivo prevalente es el preservativo se utiliza un 6.27% y un 3.47% menos que en los estudios citados. En la mitad de los casos (17.2%) se utiliza incorrectamente al igual que en el estudio Haya.

El 46.59% no utiliza anticoncepción, entre un 10% y un 17.8% más que en los estudios citados. Por nacionalidades el preservativo y la píldora son los más utilizados. Sin embargo las españolas utiliza anticoncepción en el 65.84% y las inmigrantes el 30,38%, un 20% menos que el estudio Haya.