


Condiciones que son categoría 1 y 2 para todos los métodos (método que se puede utilizar)

Edad 18-39.	Alto riesgo de VIH.	Esquistosomiasis (bilarciasis).
Anemias, incluyendo la enfermedad de células falciformes y talasemia.	Historia de diabetes gestacional.	Sin cirugía prolongada inmovilización.
Tumores benignos de ovario, incluyendo quistes.	Historia de presión arterial alta durante el embarazo.	Tomar antibióticos (excluyendo rifampicina) o griseofulvina.
Enfermedad de mama: historia familiar, enfermedad benigna de mama y masa sin diagnosticar.	Historia de cirugía pélvica, incluyendo cesárea.	Trastornos tiroideos.
Depresión.	Irregular, pesado y prolongado sangrado menstrual.	Tuberculosis (pero si es pélvica, no puede usar el DIU).
Dismenorrea.	Malaria	Enfermedad valvular del corazón sin complicaciones.
Endometriosis.	Antecedentes de embarazo ectópico	Venas varicosas.
Epilepsia.	Post-aborto (no infección).	Hepatitis viral (no activo).

Notas a las condiciones

- A Puede insertar el DIU de cobre o de levonorgestrel, si no lacta, <48 horas después del parto o ± 4 semanas.
- B Si ella no tuvo ningún embarazo posterior, DIU = 2.
- C U otras forma de cervicitis purulenta.
- D Si desarrolla este estado mientras está usando el DIU, puede seguir usándolo durante el tratamiento.
- E Si hay alto riesgo de ITS o VIH, se aconseja el uso del condón.
- F Si es muy alta la probabilidad de exposición a la gonorrea o clamidia = 3.
- G Si en Terapia ARV = 2.
- H Si tiene SIDA pero no va bien en terapia ARV = 3.
- I AOC y fumar mucho = 4. CIC y fumar poco = 2.
- J Si la presión arterial no se puede medir, y ella no tiene historia de hipertensión, se pueden utilizar todos los métodos.
- K La misma categoría se aplica a la hipertensión controlada.
- L Los factores de riesgo incluyen: edad avanzada, tabaquismo, diabetes, hipertensión.
- M Para comprobar si la migraña tiene aura, pregúntele: "¿Ve un punto brillante antes de un fuerte dolor de cabeza?"
- N Migraña sin aura y <35 años, AOC y CIC = 2. Migraña sin aura ≥35 años, AOC y CIC = 3.
- O Para diabetes complicadas, o tener diabetes durante más de 20 años, AOC, CICS, DMPA, NET-EN = 3-4.
- P AOC = 3, CIC = 2.
- Q Fenitoina, carbamezepine, barbitúricos, primidona, topiramato, oxcarbazepina. Para lamotrigina AOCs/ACIs = 3. Otros métodos=1
- R Si ella no está clínicamente bien, DIU = 3.
- S Si la cavidad uterina está distorsionada, no puede usar el DIU.
- T >45 años = 2.
- U Si la terapia anticoagulante está establecida = 2.



*AMPD: Acetato de Medroxiprogesterona de Depot. EN-NET: Enantano de Noretisterona (otro progestágeno pinchado)

1. Use el método en cualquier circunstancia.
2. En general, use el método.
3. Habitualmente no se recomendará el método, salvo que no haya otros métodos más apropiados disponibles o aceptables.
4. NO se debe usar el método.

Esta rueda contiene criterios médicos de elección para la iniciación en el uso de métodos anticonceptivos. Está basada en la guía WHO Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 3ª edición, 2004 y revisión de 2008.

